



F.I.S.I.

Federazione Italiana Sport Invernali

CONVENZIONE MULTIRISCHI

Allegato A

Tabella Lesioni

Allegato "A"

Tabella Lesioni - Decreto Ministeriale 3 novembre 2010

TIPOLOGIA DI LESIONE

LESIONI APPARATO SCHELETRICO

CRANIO

| | |
|---|-------|
| FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% |
| FRATTURA SFENOIDE | 5,00% |
| FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 3,00% |
| FRATTURA LEFORT I (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4,00% |
| FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro né con LEFORT I) | 7,00% |
| FRATTURA ETMOIDE | 3,00% |
| FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) | 2,00% |
| FRATTURA OSSA NASALI | 2,50% |
| FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4,00% |
| LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | 5,00% |
| TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 8,00% |

COLONNA VERTEBRALE

TRATTO CERVICALE

| | |
|--|--------|
| FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |
| FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA | 8,00% |
| FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO o PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA | 10,00% |

TRATTO DORSALE

| | |
|--|-------|
| FRATTURA DEL CORPO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4,00% |
| FRATTURA DEL CORPO XII VERTEBRA | 8,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |

TRATTO LOMBALE

| | |
|--|-------|
| FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | 8,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |

OSSO SACRO

| | |
|---|-------|
| FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 4,00% |
|---|-------|



ALLIANZ S.p.A.

| | | |
|--|--|--------|
| COCCIGE | | |
| FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | | 4,00% |
| BACINO | | |
| FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | | 3,00% |
| FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) | | 6,00% |
| TORACE | | |
| FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | | 4,00% |
| FRATTURA STERNO | | 2,00% |
| FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) | | 0,50% |
| FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) | | 1,50% |
| FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) | | 3,00% |
| PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA | | 6,00% |
| PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | | 10,00% |
| ARTO SUPERIORE (DX o Sn) | | |
| BRACCIO | | |
| FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | | 3,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | | 6,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | | 6,00% |
| AVAMBRACCIO | | |
| FRATTURA DIAFISARIA RADIALE | | 2,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | | 4,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | | 4,00% |
| FRATTURA DIAFISARIA ULNARE | | 2,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | | 4,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) | | 4,00% |
| FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | | 4,00% |
| FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | | 5,00% |
| POLSO E MANO | | |
| FRATTURA SCAFOIDE | | 5,00% |
| FRATTURA SEMILUNARE | | 3,00% |
| FRATTURA PIRAMIDALE | | 2,00% |
| FRATTURA PISIFORME | | 1,00% |
| FRATTURA TRAPEZIO | | 2,00% |
| FRATTURA TRAPEZOIDE | | 2,00% |
| FRATTURA CAPITATO | | 2,00% |



ALLIANZ S.p.A.

| | |
|--|--------|
| FRATTURA UNCINATO | 2,00% |
| FRATTURA I METACARPALE | 6,00% |
| FRATTURA II O III O IV O V METACARPALE | 3,00% |
| SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | 4,00% |
| FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |
| POLLICE | 4,00% |
| INDICE | 3,00% |
| MEDIO | 3,00% |
| ANULARE | 2,00% |
| MIGNOLO | 3,00% |
| FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |
| POLLICE | 3,00% |
| INDICE | 2,50% |
| MEDIO | 2,00% |
| ANULARE | 1,00% |
| MIGNOLO | 2,00% |
| FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |
| INDICE | 2,00% |
| MEDIO | 1,00% |
| ANULARE | 1,00% |
| MIGNOLO | 2,00% |
| ARTO INFERIORE (DX o Sx) | |
| FRATTURA FEMORE | |
| DIAFISARIA | 6,00% |
| EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico) | 10,00% |
| EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 10,00% |
| FRATTURA ROTULA | 4,00% |
| FRATTURA TIBIA | |
| DIAFISARIA | 3,00% |
| ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 5,00% |
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 5,00% |
| FRATTURA PERONE | |
| DIAFISARIA | 2,00% |
| ESTREMITA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale) | 3,00% |
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4,00% |



ALLIANZ S.p.A.

| | |
|--|--------|
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | 5,00% |
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | 6,00% |
| PIEDE TARSO | |
| FRATTURA ASTRAGALO | 6,00% |
| FRATTURA CALCAGNO | 7,00% |
| FRATTURA SCAFOIDE | 3,00% |
| FRATTURA CUSOIDE | 4,00% |
| FRATTURA CUNEIFORME | 1,00% |
| METATARSI | |
| FRATTURA I METATARSALE | 4,00% |
| FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE | 2,00% |
| FALANGI | |
| FRATTURA ALLUCE (I o II Falange) | 2,50% |
| FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |
| LESIONI DENTARIE | |
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70% |
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20% |
| ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 0,50% |
| ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 1,00% |
| ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,50% |
| ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,75% |
| ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 1,50% |
| ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | 1,00% |
| ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 0,25% |
| ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 0,50% |
| LESIONI PARTICOLARI | |
| ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 8,00% |
| ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00% |
| ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 15,00% |
| ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10,00% |
| GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | 40,00% |
| RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- | 20,00% |



ALLIANZ S.p.A.

| | |
|--|---------|
| RESEZIONE DEL TENUCE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile- | 40,00% |
| RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile- | 15,00% |
| COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- | 40,00% |
| AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- | 60,00% |
| COLECISTECTOMIA -non cumulabile- | 5,00% |
| SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | 4,00% |
| SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | 6,00% |
| EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00% |
| PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSITIVO (HIV +) | 4,00% |
| PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile- | 50,00% |
| ERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) | 3,00% |
| ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
| LOBECTOMIA POLMONARE | 15,00% |
| PNEUMONECTOMIA | 30,00% |
| PROTESI SU AORTA TORACICA | 20,00% |
| PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | 15,00% |
| PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 35,00% |
| CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25,00% |
| PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00% |
| SORDITA' COMPLETA UNILATERALE | 12,00% |
| SORDITA' COMPLETA BILATERALE | 50,00% |
| PERDITA NASO (oltre i due terzi) | 30,00% |
| CORDECTOMIA | 15,00% |
| EMILARINGECTOMIA | 25,00% |
| LARINGECTOMIA | 50,00% |
| PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00% |
| PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 8,00% |
| PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 15,00% |
| ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima - trattata/e chirurgicamente-) | 8,00% |
| ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
| PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20,00% |
| PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 25,00% |
| PATELLECTOMIA TOTALE | 10,00% |
| PATELLECTOMIA PARZIALE | 4,00% |
| PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 5,00% |



ALLIANZ S.p.A.

| | |
|--|--------|
| PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 25,00% |
| PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 30,00% |
| ISTERECTOMIA (non cumulabile) | 20,00% |
| ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | 30,00% |
| OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | 5,00% |
| USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) | 30,00% |
| PTOSI PALPEBRALE | 5,00% |
| EVIRAZIONE COMPLETA | 45,00% |
| PERDITA DEL PENE | 35,00% |
| IMPOSSIBILITÀ ALL'EREZIONE | 25,00% |
| CASTRAZIONE | 25,00% |

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE

| | |
|--|--------|
| ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 9,00% |
| ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
| ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
| ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- | 3,00% |
| ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 6,00% |
| LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4,00% |
| LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
| LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 5,00% |
| LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 3,00% |
| LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
| LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 6,00% |
| LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile- | 5,00% |
| LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito- | 2,50% |
| LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
| LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 10,00% |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 2,00% |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II O III O IV O V DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | 1,00% |
| LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
| LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro- | 8,00% |
| LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 2,50% |
| LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 2,50% |
| LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 6,00% |



ALLIANZ S.p.A.

| | |
|--------------------------|-------|
| LUSSAZIONE ULNO CARPICA | 3,00% |
| LUSSAZIONE ROTULA | 3,00% |
| LUSSAZIONE TIBIO TARSICA | 6,00% |
| LUSSAZIONE VERTEBRALE | 5,00% |

AMPUTAZIONI

ARTO SUPERIORE

| | |
|--|--------|
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE | 80,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO | 70,00% |
| AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | 52,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 58,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | 56,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 50,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 44,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | 45,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | 42,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | 47,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | 38,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | 43,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | 40,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | 32,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 37,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 30,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | 35,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | 35,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | 28,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | 33,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | 24,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | 22,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | 27,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | 18,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | 23,00% |
| AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | 20,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 20,00% |



ALLIANZ S.p.A.

| | |
|---|--------|
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE | 14,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | 10,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE | 7,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | 12,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE | 5,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | 3,50% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | 2,50% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | 4,50% |
| AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'INDICE | 10,00% |
| AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MEDIO | 8,00% |
| AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'ANULARE | 6,00% |
| AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MIGNOLO | 9,00% |

ARTO INFERIORE

| | |
|---|---------|
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | 70,00% |
| AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) | 65,00% |
| AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 65,00% |
| AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50,00% |
| PERDITA DI UN PIEDE | 45,00% |
| PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 27,00% |
| PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100,00% |
| PERDITA DELL'ALLUCE | 6,00% |
| PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 3,00% |
| PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |

LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati)

ARTO SUPERIORE

| | |
|---|--------|
| LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | 60,00% |
| SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1 | 45,00% |
| SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE | 45,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | 18,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | 35,00% |
| PARALISI BASSA NERVO RADIALE | 25,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO | 40,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO ULNA | 25,00% |



ALLIANZ S.P.A.

PARALISI BASSA NERVO ULNARE 20,00%

ARTO INFERIORE

PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4 35,00%

PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE 30,00%

PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO 45,00%

PARALISI BASSA NERVO SCIATICO 38,00%

PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO 20,00%

PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO 22,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE

EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE 15,00%

EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI 30,00%

PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO 40,00%

MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO 40,00%

MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO 35,00%

USTIONI

CAPO

USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 3,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 10,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO 14,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 18,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO 5,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO 10,00%

ARTI SUPERIORI E INFERIORI

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 5,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 10,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 15,00%

USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 20,00%



ALLIANZ S.p.A.